



probelte **pharma**

Veb  
Inyectable

## Vía

---

La vacuna específica bacteriana inyectable se administra por vía subcutánea.



## Composición Galénica y Bacteriana

---

El principio activo es un lisado de cepas microbianas tipificadas según la fórmula prescrita por el médico especialista.

**Excipientes:** fenol (conservante), cloruro sódico y agua para inyección.

## Indicaciones

---

La **vacuna específica bacteriana inyectable** es una vacuna terapéutica específica e individualizada indicada en la prevención o como adyuvante del tratamiento de procesos infecciosos recurrentes o que responden mal al tratamiento convencional. **Infecciones de las vías respiratorias tanto superiores como inferiores:** faringoamigdalitis, laringitis, adenoiditis, rinitis, sinusitis, otitis, traqueítis, bronquitis, así como aquellas infecciones que originan agudizaciones o exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas tales como asma bronquial, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, etc. **Infecciones causadas por uropatógenos:** prostatitis, cistitis, etc.

## Presentación

---

### *TRATAMIENTO DE INICIO*

El laboratorio suministra este tratamiento en dos presentaciones distintas, a elegir por el médico especialista:

#### ***Presentación A***

Tratamiento de 3 viales con etiquetas de distintos colores y conteniendo cada uno 5 ml de extracto bacteriano de distinta concentración.

<b>VIAL N°1 (AZUL)</b>	250 MG/ml
<b>VIAL N° 2 (AMARILLO)</b>	500 MG/ml
<b>VIAL N° 3 (PÚRPURA)</b>	1000 MG/ml

#### ***Presentación B***

Tratamiento en 2 ó 3 viales de la misma concentración con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada vial un volumen mínimo de 5 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

<b>VIAL N° 3 (PÚRPURA)</b>	1000 MG/ml
----------------------------	------------

## TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

El laboratorio suministra este tratamiento en 2 ó 3 viales de la misma concentración con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada vial un volumen mínimo de 5 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

**VIAL N° 3 (PÚRPURA)**

1000 MG/ml

## Pauta de administración sugerida por el laboratorio

### TRATAMIENTO DE INICIO

#### Presentación A

**Duración aproximada:** 3 meses y medio

Vial	Dosis (ml)		Intervalo (días)
	Adultos	Niños	
<b>1</b> Azul	0,1	0,05	INICIO
	0,2	0,1	7
	0,4	0,2	7
	0,6	0,3	7
	0,8	0,4	7
<b>2</b> Amarillo	0,4	0,2	7
	0,6	0,3	7
	0,8	0,4	7
<b>3</b> Púrpura	0,4	0,2	7
	0,6	0,3	7
	0,8	0,4	7
	0,8	0,4	7
	0,8	0,4	7
	0,8	0,4	7

## Presentación B

**Duración (2 viales 3):** aproximada 6 meses

**Duración (3 viales 3):** aproximada 9 meses

Vial	Dosis (ml)	Intervalo (días)
3 Púrpura	0,1	INICIO
	0,2	7
	0,4	7
	0,6	7
	0,8	7
	0,8	15

SE CONTINUARÁ CON ESTA DOSIS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS VIALES

## TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

**Duración (2 viales 3):** aproximada 6 meses

**Duración (3 viales 3):** aproximada 9 meses

Vial	Dosis (ml)	Intervalo (días)
3 Púrpura	0,4	15
	0,8	15

SE CONTINUARÁ CON ESTA DOSIS HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS VIALES



probeltepharma

**Probelte Pharma, S.L.U**

C/ Antonio Belmonte Abellán, 7 30100 (Murcia)

Tlf: 968 85 85 77

[info@probeltepharma.es](mailto:info@probeltepharma.es)

[www.probeltepharma.es](http://www.probeltepharma.es)