



probelte **pharma**

Autovacuna

Tópica Nasal

autovacuna tópica nasal

Vía

La vacuna autovacuna tópica nasal se administra por vía nasal-oral.

Composición galénica y bacteriana

El principio activo es un lisado bacteriano preparado a partir de gérmenes procedentes de la muestra que en su día fue recogida por el médico especialista.

Excipientes: timerosal (conservante al 0,01 %) solución salina tamponada (cloruro sódico, fosfato sódico dihidrogenado, fosfato disódico) y agua purificada.

Indicaciones

La **autovacuna tópica nasal** es una vacuna terapéutica específica e individualizada indicada en la prevención o como adyuvante del tratamiento de procesos infecciosos recurrentes o que responden mal al tratamiento convencional. **Infecciones de las vías respiratorias tanto superiores como inferiores:** faringoamigdalitis, laringitis, adenoiditis, rinitis, sinusitis, otitis, traqueítis, bronquitis, así como aquellas infecciones que originan agudizaciones o exacerbaciones de enfermedades respiratorias crónicas tales como asma bronquial, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, etc. **Infecciones causadas por uropatógenos:** prostatitis, cistitis, etc.

Presentación

TRATAMIENTO DE INICIO

El laboratorio suministra este tratamiento en dos presentaciones distintas, a elegir por el médico especialista:

Presentación A

Tratamiento de 3 viales con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada uno 7 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

VIAL N° 3 (Púrpura)

1400 MG/ml

Presentación B

Tratamiento de 3 ó 4 viales con etiquetas de distintos colores y conteniendo cada uno 7 ml de lisado bacteriano de distinta concentración. El vial nº 0 es opcional y, según criterio médico, se podrá solicitar dependiendo de la sensibilidad del paciente

VIAL Nº 0 (Gris)	175 MG/ml
VIAL Nº1 (Azul)	350 MG/ml
VIAL Nº 2 (Amarillo)	700 MG/ml
VIAL Nº 3 (Púrpura)	1400 MG/ml

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

El laboratorio suministra este tratamiento en 2 ó 3 viales con etiqueta de color púrpura, conteniendo cada vial 7 ml de extracto bacteriano de igual concentración.

VIAL Nº 3 (Púrpura)	1400 MG/ml
---------------------	------------

Pauta de administración sugerida por el laboratorio

TRATAMIENTO DE INICIO

Presentación A

Duración aproximada: 3 meses

Vial	Dosis
Nº 3 (Púrpura)	Comenzar con una nebulización en faringe y en cada fosa nasal días alternos durante la primera semana Continuar con una nebulización en faringe y en cada fosa nasal todos los días hasta la terminación del contenido de los viales.

Presentación B

Duración (viales nº 0, 1, 2, 3): 4 meses

Duración (viales nº 1, 2, 3): 3 meses

Vial	Dosis
Nº0 (Gris)	Una nebulización en faringe y en cada fosa nasal durante 30 días.
Nº1 (Azul)	Una nebulización en faringe y en cada fosa nasal durante 30 días.
Nº 2 (Amarillo)	Una nebulización en faringe y en cada fosa nasal durante 30 días.
Nº 3 (Púrpura)	Una nebulización en faringe y en cada fosa nasal durante 30 días.

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

Duración aproximada (2 viales nº3): 2 meses

Duración aproximada (3 viales nº3): 3 meses

Vial	Dosis
Nº 3 (PÚRPURA)	Una nebulización en faringe y en cada fosa nasal todos los días hasta la terminación del contenido de los viales.



probeltepharma

Probelte Pharma, S.L.U

C/ Antonio Belmonte Abellán, 7 30100 (Murcia)

Tlf: 968 85 85 77

info@probeltepharma.es

www.probeltepharma.es