



probelte **pharma**

Beltavac

Depot

Vía de Administración

Vía Subcutánea

beltavac
DEPOT

Composición galénica

Principios activos: según fórmula indicada por el médico especialista.

Excipientes: Hidróxido de aluminio, fenol, cloruro sódico y agua para inyección.

Composición alérgica

Todos los alérgenos del catálogo de PROBELTE PHARMA están disponibles para este tipo de tratamiento.

Indicaciones

Rinitis, conjuntivitis o asma por hipersensibilidad Ig E mediada a alérgenos inhalados.

Presentación

Se suministran en viales con la composición indicada en la prescripción médica, con las siguientes concentraciones:

Vial nº	Color etiqueta	Concentración RC/ml	Volumen
3	Púrpura	0,1 (ácaros)	5 ml
		0,2 (hongos)	
		1 (pólenes y epitelios)	

Tratamiento de inicio: Caja con 2 viales nº 3.

Tratamiento de continuación: Caja con 1 ó 2 viales nº 3



Pautas de administración recomendadas

Tratamiento de inicio:

PAUTA CLUSTER

Día	Vial (nº/color)	Dosis administrada (ml)	Intervalo dosis (minutos)
Inicio	3 (Púrpura)	0,1 0,2	30'
7	3 (Púrpura)	0,4 0,4	30'
21	3 (Púrpura)	0,8	-
51	3 (Púrpura)	0,8	-

Las dosis restantes de 0,8 ml de la pauta cluster se administrarán cada 30 días.

Tratamiento de continuación:

Vial (nº/color)	Dosis administrada (ml)	Intervalo (días)
3 Púrpura	0,4	30
	0,8	30
	0,8	...

Las dosis restantes de 0,8 ml cada 30 días hasta finalizar el contenido de los viales.

Duración del envase

Tratamiento de inicio:

12 meses

Tratamiento de continuación:

1 vial nº 3: 6 meses
2 viales nº 3: 12 meses



probeltepharma

Probelte Pharma, S.L.U

C/ Antonio Belmonte Abellán, 7 30100 (Murcia)

Tlf: 968 85 85 77

info@probeltepharma.es

www.probeltepharma.es